

登革熱與自我防護

健康促進中心



什麼是「登革熱？」

- 登革熱俗稱天狗熱，又稱斷骨熱，是一種由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播的急性病毒性熱病。
- 病媒蚊喜歡在**白天**活動叮咬人。
- 登革病毒共有四型，重複感染不同型的登革病毒，可能引起登革出血熱，若不儘速就醫治療，死亡率可高達50%。



埃及斑蚊



白線斑蚊

腳上都有黑白相間的斑紋

感染過程

- 傳染方式

- 經由病媒蚊叮咬傳播

- 潛伏期

- 潛伏期約3-8天(最長可達14天)

- 可傳染期

- 病人發病前1天至發病後5天為病毒血症期
- 病毒在蚊體內經8-12天的增殖，使蚊子具有感染力

- 感染性及抵抗力

- 於性別及年齡無顯著差異
- 感染某一型登革病毒患者，對該型病毒具有終身免疫，對其他型別僅具有短暫的免疫力




症 狀

突發發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 並伴隨下列兩（含）種以上症狀

- ◆頭痛
- ◆後眼窩痛
- ◆肌肉痛
- ◆關節痛
- ◆出疹
- ◆出血性癍候(hemorrhagic manifestations)
- ◆白血球減少(leucopenia)

****請盡速就醫並告知旅遊史****



早期偵測、及早通報

防治效果愈好

同學自覺感染登革熱，或疑似登革熱案例，主動撥打疫情通報電話

1922或至健促中心。




旅遊防蚊做得好

境外登革熱沒煩惱



至疫區旅遊，應著寬鬆長袖衣褲，
身體裸露部位塗抹防蚊藥膏



台灣歷年多起始於夏季初秋之際(7月~9月)，
於10月~11月達到高峰，12月後疫情趨和緩



臺灣登革熱病例，主要為出國旅遊或經商，在國外感染的境外移入個案



本土病例主要集中在南部地區

杜絕境外登革熱

“自主健康管理”

自主健康管理 **10** 天，每天至少量測體溫 **2** 次並記錄

若有登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並告知醫師旅遊史



登革熱防治需要大家的參與

沒有積水容器，就沒有病媒蚊孳生源

沒有孳生源，就沒有登革熱病媒蚊



短片

感謝您的聆聽!

